

PACIENTES PSIQUIATRICOS

Dentro del grupo de pacientes psiquiátricos, el diagnóstico psiquiátrico más frecuente es la esquizofrenia y en menor proporción demencia y depresivos endógenos.

Esquizofrenia: Según la American Psychiatric Association se define como un trastorno mental con tendencia hacia la cronicidad que se caracteriza por síntomas psicóticos que incluyen alteraciones del pensamiento, sentimiento y conducta.

En general, el paciente psiquiátrico presenta una serie de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades orales, a saber:

- El abandono del cuidado personal y por lo tanto oral.
- Inadaptación social y económica.
- En general, tienen un bajo nivel de educación.
- Problemas familiares.
- Derivado de la patología, pueden aparecer actos de automutilación orofacial, como glosectomía, auto extracciones múltiples, excoriaciones de las encías con uñas afiladas, o quemaduras de las encías.
- Tanto en los pacientes con esquizofrenia como en otras patologías psiquiátricas, hay que tener en cuenta el tipo de tratamiento farmacológico utilizado, ya que los neurolépticos (fenotiacinas, butirofenonas y tioxantenos), causan hiposalivación por bloqueo de la estimulación parasimpática de las glándulas salivales, teniendo en cuenta que la xerostomía es un factor importante en el desarrollo de enfermedad periodontal y caries, y además queilosis angular, queilitis, áreas eritematosas en mucosa, ulceraciones orales y candidiasis.

Los resultados obtenidos demostraron:

- ~ Una alta prevalencia al desarrollo de caries, siendo mayor en paciente con esquizofrenia.
- ~ El índice gingival es mayor en éste tipo de paciente, por tanto hay mayor enfermedad gingival y periodontal.
- ~ Se encontraron pacientes con leucoplasia oral, sobre todo en pacientes fumadores de más de un paquete de cigarrillos diario.
- ~ Debido a lo anteriormente mencionado, un alto porcentaje presentaba edentulismo.